

# Einführung in die Quantentheorie

Präsenzübung, Blatt 11

SoSe 2018

26./27.06.2018

## [P27] Teilchen im konstanten Magnetfeld

Betrachten Sie ein Teilchen mit Spin  $1/2$ , Ladung  $e$  und Masse  $m$ .

- (a) Geben Sie die Eigenwerte der Spinoperatoren  $S_x$ ,  $S_y$  und  $S_z$  an.
- (b) Das Teilchen sei in einem Eigenzustand von  $S_x$ . Man misst  $S_z$ . Welche Messwerte sind möglich und mit welchen Wahrscheinlichkeiten werden sie erhalten?
- (c) Der Hamiltonoperator dieses Teilchens im konstanten Magnetfeld  $\vec{B} = B\vec{e}_z$  sei gegeben durch

$$H = \frac{e\hbar}{mc} BS_z.$$

Das System befinde sich zur Zeit  $t = 0$  im Eigenzustand von  $S_x$  mit dem Eigenwert  $1/2$ . Berechnen Sie den Zustand zur Zeit  $t > 0$ .

- (d) In diesem System wird dann (also zu einem Zeitpunkt  $t > 0$ )  $S_x$  gemessen. Was ist das Ergebnis? Was ergibt sich bei einer  $S_z$ -Messung? Diskutieren Sie die Ergebnisse, insbesondere die Abhängigkeiten von  $t$ .
- (e) Berechnen Sie die Erwartungswerte  $\langle S_x \rangle$ ,  $\langle S_y \rangle$  und  $\langle S_z \rangle$ .

## [P28] Kopplung von Drehimpulsen

Ein Elektron (Spin  $s = 1/2$ ) befinde sich in einem Zustand mit Bahndrehimpuls  $\ell = 1$ . Berechnen Sie die *Clebsch-Gordan-Koeffizienten*  $\langle m_\ell, m_s | j, m \rangle$  für die Basis transformation

$$|j, m\rangle = \sum_{\substack{m_\ell, m_s \\ m_\ell + m_s = m}} |m_\ell, m_s\rangle \langle m_\ell, m_s | j, m \rangle$$

bei der Kopplung des Bahndrehimpulses an den Spin des Elektrons. Der Zustand  $|m_\ell, m_s\rangle$  bezeichnet dabei das Tensorprodukt  $|\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle$ .

Verwenden Sie die Auf- und Absteige-Operatoren

$$J_+ = \hat{L}_+ + \hat{S}_+ \quad \text{und} \quad J_- = \hat{L}_- + \hat{S}_-.$$

Machen Sie sich klar, dass damit – sofern  $L$  und  $S$  miteinander kommutieren – gilt:

$$\begin{aligned} \sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)} |j, m\pm 1\rangle = \\ \sqrt{\ell(\ell+1) - m_\ell(m_\ell\pm 1)} |m_\ell\pm 1, m_s\rangle + \sqrt{s(s+1) - m_s(m_s\pm 1)} |m_\ell, m_s\pm 1\rangle. \end{aligned}$$